


大腸カプセル内視鏡の前処置について

必要物品・・・プルゼニド2錠 マグコロールP 自宅にあるコップ 水(水道水で可)
ナウゼリン1錠 ラキシベロン1本 時計

※ 大腸カメラ前日に、出来れば摂取しないで欲しい食品の一覧

ニラ、ネギ、わかめ、ひじき、トマトの皮、キャベツの硬いところ、ごぼう、こんにゃく
繊維の多いもの、オクラ・キウイ・スイカ等のたね類、ごま等)

便秘の方は2～3日前から控えてもらうと良いでしょう。



1. 検査前日の夕食後 **夜10時から絶食**してください。(水・お茶は飲んでも大丈夫です。)
2. **寝る前**にコップ一杯程度のお水で 下剤(**プルゼニド2錠 赤い粒**)を服用下さい。
3. **検査当日の朝食は絶食**です。お水やお茶は朝10時まで飲水可能です。

薬を服用されている方は要相談ですので申し出てください。

(血圧のお薬など指示されたお薬は基本的に検査後に服用してください。)

4. 検査当日の**6時00分**・・・マグコロールPのふたを開け 500cc程度水を入れよく振って薬を溶かしてください。溶解する前は粉末状です。
全て溶けたのを確認したら1800ccまで水を入れてください。

5. 吐き気止め(**ナウゼリン1錠 白い粒**)をコップ一杯のお水で 服用してください。

6. 先ほど作ったマグコロールPの服用開始です。

まずコップに**ラキシベロンを1本**全て入れます

その上から マグコロールをコップ一杯になるまで、注いで下さい。

6時00分から7時00分の60分で900cc服用していただきます。

残りの900ccを7時00分から8時00分までに服用してください。



※マグコロールPの服用終了近く あるいは服用後に便意をもよおしてくると思います。

※マグコロールPの服用開始時間は厳守してください(検査開始に影響が出ます)

7. 5回から10回程度の排便があります。便の状態を観察しておいてください。

※腹部マッサージや軽い運動(ウォーキング)をすると排便がよくなります。それでも排便がスムーズに出ない時には、追加の処置を行うことがあります。

8. 便の状態は水様になるのが目標ですが、水様の薄黄色の状態でも十分検査できます。



9. 9時前に来院してください。

来院されましたら受付に診察券・予約票・同意書を提出してください。

10. 大腸カプセル内視鏡は、長さ31.5ミリ、直径11.6ミリで薬のカプセルのような形をしたものです。これを口から飲み込むだけで検査が出来ます。カプセルを飲みこんだ後に追加の下剤を飲んでカプセルを流していきます。

11. カプセルの小型カメラが内蔵されており、1秒間に最大35枚の撮影が出来ます。無線で大腸の画像データを送信して外部装置に記録し、その情報をコンピューターで解析します。カプセルは使い捨てなので、検査後 排便とともに体外へ排出されます。

12. カプセルが排出されれば検査終了です。(平均3-4時間です。)

13. ご不明な点があれば何なりとご質問ください。

14. 予約をキャンセル あるいは日程の変更をご希望の時は電話にてご連絡ください。

ひうらクリニック 072-782-1211