


# 大腸カメラの前処置について

必要物品…プルゼニド2錠 マグコロールP 自宅にあるコップ 水(水道水で可)  
ナウゼリン1錠 ラキシベロン1本 時計

※ 大腸カメラ前日に、出来れば摂取しないで欲しい食品の一覧

ニラ、ネギ、わかめ、ひじき、トマトの皮、キャベツの硬いところ、ごぼう、こんにゃく  
繊維の多いもの、オクラ・キウイ・スイカ等のたね類、ごま等)

便秘の方は2~3日前から控えてもらうと良いでしょう。



1. 検査前日の夕食後 **夜10時から絶食**してください。(水・お茶は飲んでも大丈夫です。)

2. **寝る前**にコップ一杯程度のお水で 下剤(**プルゼニド2錠 赤い粒**)を服用下さい。

3. **検査当日の朝食は絶食**です。お水やお茶は朝10時まで飲水可能です。

薬を服用されている方は要相談ですので申し出てください。

(血圧のお薬など指示されたお薬は7時までに服用してください。)

4. 検査当日の**9時30分**…マグコロールPのふたを開け 500cc程度水を入れ  
よく振って薬を溶かしてください。溶解する前は粉末状です。

全て溶けたのを確認したら1800ccまで水を入れてください。

5. **9時40分**…吐き気止め(**ナウゼリン1錠 白い粒**)をコップ一杯のお水で  
服用してください。

6. **9時45分**…先ほど作ったマグコロールPの服用開始です。

まずコップに**ラキシベロンを1本**全て入れます

その上から マグコロールをコップ一杯になるまで、注いで下さい。

**9時45分から10時30分の45分で900cc服用**していただきます。

**残りの900ccを10時30分から11時15分までに服用**してください。



※マグコロールPの服用終了近く あるいは服用後に便意をもよおしてくると思います。

※マグコロールPの服用開始時間は厳守してください(検査開始に影響が出ます)

※服用中吐き気や腹部膨満感 腹痛等起こることがあります。

その際には当院までお電話ください。

7. 5回から10回程度の排便があります。便の状態を観察しておいてください。

※腹部マッサージや軽い運動(ウォーキング)をすると排便がよくなります。それでも排便がスムーズに出ない時には、追加の処置を行うことがありますので早めに連絡をお願いします。

8. 何かお困りの事があれば、

クリニックにお電話ください。(072-782-1211)。

便の状態は水様になるのが目標ですが、水様の薄黄色の状態でも十分検査できます。



※病院来院の際は 車 バイク 自転車での来院は避けてください。

(鎮静剤・鎮痛剤を使用した場合、検査後の運転は危険を伴う為控えていただきます。)

9. 来院されましたら受付に診察券・予約表・同意書を提出してください。

その後、検査用使い捨てパンツに着替えていただきます。

10. 内視鏡室のベッドに左を下に寝ていただいて検査を開始します。カメラがスムーズに挿入できるように 肛門に潤滑ゼリーを塗布します。

11. 検査中は、苦痛がないように鎮痛剤 鎮静剤を点滴注射いたします。

12. 検査中腸の中に空気を入れるためお腹が張ります。

遠慮なさらずにガスを出してください。

13. 検査内容によっては、検査後の飲酒や運動が制限される場合がありますので、ご了承ください。

14. ご不明な点があれば何なりとご質問ください。

15. 予約をキャンセル あるいは日程の変更をご希望の時は電話にてご連絡ください。

ひうらクリニック 072-782-1211