


# 大腸カメラの前処置について

必要物品・・・センノシド2錠 マグコロールP 自宅にあるコップ  
水（水道水で可）ドンペリドン1錠 ピコスルファート1本 時計

※ 大腸カメラ前日に、出来れば摂取しないで欲しい食品の一覧  
ニラ、ネギ、わかめ、ひじき、トマトの皮、ごぼう、こんにゃく  
繊維の多いもの、オクラ・キウイ・スイカ等のたね類、ごま等）  
便秘の方は2～3日前から控えてもらうと良いでしょう。



1. 検査前日の夕食後 **夜10時から絶食**してください。  
(水・お茶は飲んでも大丈夫です。)
2. **寝る前**にコップ一杯程度のお水で 下剤 (**センノシド2錠 赤い粒**) を服用下さい。
3. **検査当日の朝食は絶食**です。

薬を服用されている方は要相談ですので申し出てください。  
(血圧のお薬など指示されたお薬は7時までに服用してください。)

4. 検査当日 **検査開始5時間前**・・・マグコロールPのふたを500ml程度水を入れよく振って薬を溶かしてください。溶解する前は粉末状です。  
全て溶けたのを確認したら1800mlまで水を入れてください。



5. 吐き気止め(**ドンペリドン1錠 白い粒**) を  
コップ一杯のお水で 服用してください。
6. 先ほど作ったマグコロールPの服用開始です。  
まずコップに**ピコスルファートナトリウムを1本**全て入れます  
その上から マグコロールをコップ一杯になるまで、注いで下さい。

**マグコロールP1800mlを約1時間半で飲んでください。**

※マグコロールPの服用終了近く あるいは服用後に便意をもよおしてくると思います。マグコロールPの服用開始時間は厳守してください。

※服用中吐き気や腹部膨満感 腹痛等起こることがあります。

7. 5回から10回程度の排便があります。便の状態を観察しておいてください。

※腹部マッサージや軽い運動（ウォーキング）をすると排便がよくなります。

それでも排便がスムーズに出ない時には、追加の処置を行うことがありますので早めに連絡をお願いします。



**8. ご不明な点がございましたらクリニックにお電話ください。**

**072-782-1211**

便の状態は水様になるのが目標ですが、水様の薄黄色の状態でも十分検査できます。

**※病院来院の際は 車 バイク 自転車での来院は避けてください。**

（鎮静剤・鎮痛剤を使用した場合、検査後の運転は危険を伴う為控えていただきます。）

9. 来院されましたら受付に診察券・予約票・同意書を提出してください。

その後、検査用使い捨てパンツに着替えていただきます。

10. 内視鏡室のベッドに左を下に寝ていただいて検査を開始します。

カメラがスムーズに挿入できるように 肛門に潤滑ゼリーを塗布します。

11. 検査中は、苦痛がないように鎮痛剤 鎮静剤を点滴注射いたします。

12. 検査中腸の中に空気を入れるためお腹が張ります。

遠慮なさらずにガスを出してください。

13. 検査内容によっては、検査後の飲酒や運動が制限される場合がありますので、ご了承下さい。

14. ご不明な点があれば何なりとご質問ください。

15. 予約をキャンセル あるいは日程の変更をご希望の時は電話にてご連絡ください。